




CATÁLOGO 2026

SORGO

MAÍZ

GIRASOL

COLZA



SORGO



MAÍZ



GIRASOL




COLZA

CULTIVAMOS LA *PASIÓN* QUE NOS UNE

En Advanta, creemos que la pasión es el motor que nos une con quienes dedican su vida al campo. Esa pasión nos impulsa a ir más allá, a innovar con híbridos que transformen realidades y a acompañar a los productores y distribuidores en cada desafío.

Nuestra fuerza radica en mantenernos cerca, en construir relaciones de confianza y en trabajar con honestidad, empatía y compromiso. Más que un semillero, somos parte de esta gran comunidad que comparte un mismo propósito: trascender, innovar y hacer del campo un lugar de oportunidades.





 Inicio



SORGO

GRANÍFERO

ADV G2510 IGAX

ADV G2550 IGAX

ADV 1202 AX

DOBLE PROPÓSITO

ADV F8450 IG

ADV F7450 IG

VDH 422

FORRAJERO

ADV F2650 FOTO IG

ADV F2850 BMR IG

ADV 2800

La unión perfecta

Beneficios del apilamiento **igrowth**® + **aphix**®

Facilita la rotación agrícola

Mejora el coeficiente de logro a la siembra

Única herramienta en pos emergencia

Permite disminuir la altura de picado para la confección de silo

Maximiza la producción de materia seca

igrowth®
CONTROL DE MALEZAS



aphix®
TOLERANCIA A PULGÓN

Tolera los máximos niveles de infestación


Amplía la ventana de aplicación

Permite disminuir el uso de insecticidas

Permite disminuir la altura de picado para la confección de silo

Maximiza la producción de materia seca






ADV G2510 IGAX



SORGO **GRANÍFERO**

Para quien busca explorar altos rendimientos en ambientes que así lo permitan, combinando máxima tolerancia a pulgón amarillo y facilidad en el control de malezas.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	NO
CICLO	INTERMEDIO-LARGO
TIPO DE PANOJA	SEMI COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	165
DÍAS A FLORACIÓN (3)	82**
DÍAS A PICADO (4)	130**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0,3
VENTANA DE PICADO (6)	16

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO E	● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN VERDE BIO I (*)	● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
CERCOSPORA	● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	150.000 - 180.000
-------------------------------------	-------------------




ADV G2550 IGAX



SORGO **GRANÍFERO**

Combina tecnología para el control de malezas en pre/post emergencia y la máxima tolerancia a pulgón amarillo del mercado.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	NO
CICLO	INTERMEDIO-LARGO
TIPO DE PANOJA	SEMI COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	170
DÍAS A FLORACIÓN (3)	82**
DÍAS A PICADO (4)	130**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0,3
VENTANA DE PICADO (6)	16

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	I ● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO E	I ● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN VERDE BIO I (*)	I ● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	I ● TB ● TM ● TA	
CERCOSPORA	I ● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	150.000 - 180.000
-------------------------------------	-------------------




ADV 1202 AX



SORGO **GRANÍFERO**

La máxima tolerancia al pulgón amarillo en un ciclo corto que permite potenciar el rendimiento en siembras tardías o de segunda.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	NO
CICLO	INTERMEDIO - CORTO
TIPO DE PANOJA	SEMI COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	160
DÍAS A FLORACIÓN (3)	71**
DÍAS A PICADO (4)	119**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0.33
VENTANA DE PICADO (6)	15

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO E	● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN VERDE BIO I (*)	● TB ● TM ● TA	R
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
CERCOSPORA	● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	150.000 - 180.000
-------------------------------------	-------------------



REFERENCIAS

SORGO **GRANÍFERO** Y **DOBLE PROPÓSITO**

R - Resistente / S - Susceptible / NA - No Aplica

TA tolerancia alta / TM tolerancia media / TB tolerancia baja

(1) BMR (nervadura central marrón): los sorgos que tienen este carácter, contienen menos lignina que los convencionales, mejorando sustancialmente la digestibilidad del forraje

(2) Existen 4 genes de enanismo en sorgo que reducen su altura. Estos genes producen un tipo de enanismo conocido como "enanismo braquítico", los cuales reducen el largo de los entrenudos sin afectar otras características agronómicas tales como número de hojas, tamaño de la hoja, madurez o rendimiento/producción de biomasa. Los sorgos braquíticos producen cantidad de materia seca comparable a híbridos forrajeros de mayor porte ya que producen más hojas y más macollos que los sorgos forrajeros. Estos sorgos tienen una alta relación hoja/tallo. y la respuesta en la performance animal.

(3) Dato promedio para Venado Tuerto en siembras tempranas desde la campaña 2017/18 a 2021/22.

(4) Cantidad de días desde siembra hasta que el cultivo se encuentra en el rango óptimo de materia seca para la confección de silaje. Datos promedio de la red de evaluación de Advanta. Estos pueden verse modificados en función de las condiciones climáticas, manejo agronómico, nivel de tecnología aplicada, entre otros.

(5) Pérdida de humedad de la planta entera desde la formación del grano hasta el momento óptimo de picado, expresado en porcentaje de materia seca por día.

(6) Cantidad de días en que el cultivo se encuentra en el rango óptimo de materia seca para la confección de silaje (datos promedio de la red de evaluación de Advanta. Estos pueden verse modificados en función de las condiciones climáticas, manejo agronómico, nivel de tecnología aplicada, entre otros).

(#) La densidad óptima a cosecha varía de acuerdo a la disponibilidad de recursos, largo de ciclo, tecnología aplicada y manejo agronómico.

(*) Resistente Pulgón Verde de los Cereales (*Schizaphis graminum* [Rondani]) Biotipo "I".

LA RESISTENCIA A PULGON VERDE DE LOS CEREALES (*Schizaphis graminum* [Rondani]) BIOTIPO "I" CONFIERE TAMBIEN RESISTENCIA A LOS BIOTIPOS " C" "E" "G" y "H".

()** Días a floración del híbrido sin limitaciones hídricas y/o nutricionales. Bajo situaciones de estrés ambiental, el cultivo puede ingresar en un período de latencia prolongando sus días a floración.



Sorgo



Maíz




Girasol



Colza



Inicio




ADV F8450 IG



SORGO DOBLE PROPÓSITO

Para cosecha de grano o silaje de planta entera, este híbrido presenta el más alto potencial de rendimiento del segmento doble propósito



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	NO
CICLO	Largo
TIPO DE PANOJA	SEMI COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	190
DÍAS A FLORACIÓN (3)	85**
DÍAS A PICADO (4)	135**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0.25
VENTANA DE PICADO (6)	17

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO E	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO I (*)	● TB ● TM ● TA	NA
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
CERCOSPORA	● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	140.000 - 170.000
-------------------------------------	-------------------




ADV F7450 IG



SORGO DOBLE PROPÓSITO

Acorta la brecha de rendimiento en el segmento BMR, logrando la máxima calidad de fibra incluso en lotes con alta presión de malezas. Calidad y rendimiento, en su máxima expresión.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	SI
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	SI
CICLO	LARGO
TIPO DE PANOJA	COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	175
DÍAS A FLORACIÓN (3)	85**
DÍAS A PICADO (4)	135**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0.25
VENTANA DE PICADO (6)	17

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO E	● TB ● TM ● TA	
PULGÓN VERDE BIO I (*)	● TB ● TM ● TA	NA
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
CERCOSPORA	● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	140.000 - 170.000
-------------------------------------	-------------------




VDH 422

CONVENCIONAL

SORGO DOBLE PROPÓSITO

Posee un marcado mecanismo de latencia para escape ante periodos de sequía.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO


NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS	ALTO
CARÁCTER BRAQUITICO (2)	NO
CICLO	LARGO
TIPO DE PANOJA	SEMI COMPACTA
ALTURA DE PLANTA (CM)	190
DÍAS A FLORACIÓN (3)	85**
DÍAS A PICADO (4)	135**
TASA DE DESECACIÓN (5) (%MS/DÍA)	0.25
VENTANA DE PICADO (6)	21

COMPORTAMIENTO SANITARIO

ROYA	TB TM TA	
PULGÓN VERDE BIO E	TB TM TA	
PULGÓN VERDE BIO I (*)	TB TM TA	NA
PULGÓN AMARILLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR		
DOWNY MILDEW	TB TM TA	
CERCOSPORA	TB TM TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)	140.000 - 170.000
-------------------------------------	-------------------



ADV F2650 FOTO IG



SORGO **FORRAJERO**

Maximiza la cantidad de pastoreos de primavera - verano gracias a su carácter fotosensitivo, facilitando el manejo de malezas en pre y pos emergencia.




DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

USO	MÁXIMA CANTIDAD DE PASTOREOS DE PRIMAVERA - VERANO
NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	NO
FOTOSENSITIVO	SI
DÍAS A FLORACIÓN (2)	147
VELOCIDAD DE REBROTE	ALTA

COMPORTAMIENTO SANITARIO


DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
VIRUS-MDMV	● TB ● TM ● TA	

MANEJO



- 18 - 20
- 15 - 18
- 12 - 15

#DENSIDAD RECOMENDADA A LA SIEMBRA (KG/HA).



ADV F2850 BMR IG



SORGO **FORRAJERO**

Primer híbrido del mercado que combina una alta calidad de fibra gracias al carácter BMR, máxima productividad y tecnología para el control de malezas en pre y pos emergencia.




DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

USO	RODEOS LECHEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y AMBIENTES CON PRESIÓN DE MALEZAS	
NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	SI (ALTA DIGESTIBILIDAD)	
FOTOSENSITIVO	SI	
DÍAS A FLORACIÓN (2)	140	
VELOCIDAD DE REBROTE	ALTA	

COMPORTAMIENTO
SANITARIO

DOWNY MILDEW	● TB ● TM ● TA	
VIRUS-MDMV	● TB ● TM ● TA	





ADV 2800

CONVENCIONAL

SORGO FORRAJERO

Híbrido con bajo contenido de lignina (25-30% menor a un sorgo normal). Esto se debe a su carácter BMR que le permite incrementar la digestibilidad de la fibra, la velocidad de transito ruminal y el consumo voluntario.




DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

USO	RODEOS LECHEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD CON BAJA PRESIÓN DE MALEZAS
NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (1)]	SI (ALTA DIGESTIBILIDAD)
FOTOSENSITIVO	SI
DÍAS A FLORACIÓN (2)	142
VELOCIDAD DE REBROTE	ALTA

COMPORTAMIENTO
SANITARIO

DOWNY MILDEW	I ● TB ● TM ● TA	
VIRUS-MDMV	I ● TB ● TM ● TA	R





REFERENCIAS

SORGO **FORRAJERO**

R - Resistente / S - Susceptible / NA - No Aplica
TA tolerancia alta / TM tolerancia media / TB tolerancia baja

- (1)** BMR (nervadura central marrón): los sorgos que tienen este carácter, contienen menos lignina que los convencionales, mejorando sustancialmente la digestibilidad del forraje y la respuesta en la performance animal.
- (2)** Dato promedio para Venado Tuerto en siembras tempranas desde la campaña 2017/18 a 2021/22.
- (3)** Valores registrados en jugo de la parte media del tallo en Venado Tuerto. Los grados Brix expresan el porcentaje de sólidos solubles disueltos en jugo del tallo. Alrededor del 90-95 % de estos corresponden a azúcares fermentables (Glucosa, Fructosa, Sacarosa).
- (#)** La densidad óptima al momento de utilización varía de acuerdo a la disponibilidad de recursos, tecnología aplicada y manejo agronómico. Los datos presentados fueron generados en Venado Tuerto en ambientes sin limitantes.



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio



aphix®

Sembrá seguro, sembrá aphix®

El manejo integrado para el control del pulgón amarillo, *Melanaphis sacchari*, comienza en la elección de la semilla.

Advanta cuenta con un programa de investigación y desarrollo en el cultivo de sorgo desde hace más de 40 años.

Hoy, esta confianza y apuesta al cultivo, nos permite seguir avanzando con la llegada de **aphix®**, la tecnología para el manejo integrado del pulgón amarillo (*Melanaphis sacchari*).

Los híbridos con esta nueva tecnología presentan la máxima tolerancia al pulgón amarillo logrando disminuir al mínimo el riesgo de pérdidas, protegiendo el potencial de rendimiento que tanto caracteriza a nuestros sorgos Advanta. Esto es posible, ya que la tasa de reproducción del pulgón amarillo en sorgos **aphix®** es menor respecto a sorgos convencionales.

De esta manera, se logra ampliar enormemente la ventana de aplicación y disminuir el uso de insecticidas. En consecuencia, nos da más tiempo para tomar la decisión correcta.

Los tres pilares que garantizan su efectividad:

1




Selección asistida por marcadores moleculares.

2

Performance en regiones endémicas de la plaga.

3

Evaluación de tolerancia realizadas por terceros.



► SORGOS CONVENCIONALES



**SORGOS
aphix®**



Tolera los
máximos niveles
de infestación



Disminuye la tasa
de reproducción
de la plaga



Permite
disminuir el uso
de insecticidas



Amplía la
ventana de
aplicación



Aumenta el
tiempo para
la toma de
decisiones



Hace clic y conocé los **beneficios**

Sólidos resultados durante 3 campañas

A partir de la campaña 2021/22, se han realizado diversos ensayos de manera conjunta entre el INTA, Advanta y asesores externos. Se ha observado un diferencial de rendimiento de al menos un 54% para híbridos **aphix**[®] (tolerantes a PAS) versus susceptibles para el tratamiento testigo.

Híbridos **aphix**[®] obtuvieron un plus de rendimiento entorno a los 300 kg/ha para el tratamiento control a umbral versus sin aplicación. Esto remarca la importancia del monitoreo más allá de la tolerancia genética.


Eficiencia en la utilización de insecticidas

En el tratamiento con aplicación a umbral, híbridos **aphix**[®] requirieron en promedio una aplicación, mientras que las susceptibles 3 aplicaciones.

Evaluación de la dinámica poblacional y rendimiento de diferentes híbridos de sorgo aphix[®] vs Convencionales - Control Umbral (CU) / Sin Aplicación (SC)



Manejo integrado de pulgón amarillo





Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio



igrowth[®]

La mejor tecnología ante las principales barreras del cultivo de sorgo ...

Este podría ser tu sorgo sin tecnología para el control de malezas. Por suerte cuentas con **igrowth®** la tecnología que llegó para derribar una de las principales barreras para el cultivo de sorgo:



EL CONTROL EFICAZ DE MALEZAS

Es una tecnología que le confiere al sorgo tolerancia a herbicidas de la familia de las Imidazolinonas. Los agricultores podrán aplicar herbicidas registrados (Mayoral®) para el uso con sorgos **igrowth®** sin causar daño a las dosis recomendadas. Si se aplicara este herbicida sobre sorgos sin esta tecnología, se podría causar la muerte o una lesión irreversible en el cultivo.

igrowth® fue desarrollado por Advanta en Argentina, a través de todos de mutagénesis, siendo una tecnología no transgénica.

¿Cuál es el beneficio en el lote? ...

Acortar las brechas de rendimiento

Nuestros híbridos con tecnología **igrowth**® buscan disminuir la brecha. Para entender qué es lo que busca lograr la tecnología es necesario, comprender los tres pilares productivos:

1

Máximo potencial:

Rendimiento que alcanzaría un cultivo sin limitación alguna.

2

Rendimiento potencial en seco:

Donde la principal limitante es la hídrica determinado a la vez por radiación, temperatura, genotipo, fecha de siembra, densidad y suelo.


3

Rendimiento actual:


Promedio nacional que obtienen los productores y que se encuentra limitado por mala genética, falta de nutrientes, ataques de insectos, competencia con malezas, enfermedades, etc.

La diferencia entre estos dos últimos define la brecha real que deberíamos disminuir.

¿Cuál es el aporte de igrowth® a la disminución de la brecha?




Facilita el control de malezas



Menor competencia por nutrientes



Mayor rendimiento



Además:


- Facilita la rotación con el cultivo siguiente.
- Menor uso de herbicidas.
- Permite disminuir la altura de picado.
- Aumenta el número de pastoreos.
- Permite la intersembra de verdeos.

Buenas prácticas para el manejo de cultivos tolerantes a herbicidas ...

Gestión responsable de cultivos tolerantes a herbicidas ▶



Aplicación del herbicida



Planta resistente sobrevive y genera descendencia



El uso repetido de los mismos herbicidas favorece al incremento de plantas resistentes




Con el tiempo, las malezas resistentes dominan



BIOTIPO SALVAJE O SUSCEPTIBLE



BIOTIPO RESISTENTE





Consideraciones importantes

- 1 El uso de un determinado cultivo tolerante a algún herbicida particular no limita al productor a utilizar solamente dicho herbicida. Los herbicidas convencionales registrados para el cultivo pueden y deben seguir siendo parte del sistema general de manejo contra malezas.
- 2 Limitar el número de aplicaciones de un mismo herbicida, o herbicidas del mismo modo de acción, en una misma campaña.
- 3 Aplicar la dosis indicada en el marbete y en los estadíos recomendados en la etiqueta del producto.
- 4 Usar mezclas o tratamientos secuenciales alternando modos de acción de manera efectiva para controlar las malezas objetivo.
- 5 Utilizar prácticas alternativas para el manejo de malezas, tales como la rotación de cultivos, cultivos de servicio (cobertura), laboreos y el diferimiento de siembras.
- 6 Limpiar la maquinaria, antes de trasladarla de un campo a otro, para minimizar la dispersión de semillas de malezas.
- 7 Luego de realizar las aplicaciones de herbicidas, controlar los campos para detectar probables escapes o fallas.
- 8 Si se encuentra una potencial maleza (o población de malezas) resistente, usar los métodos de control disponibles para evitar su dispersión en el campo.

Propuesta de uso en sorgos graníferos y doble propósito ...


Aplicación de herbicidas


Para obtener un buen resultado es importante evaluar la situación de malezas del lote y utilizar el criterio agronómico adecuado. **El monitoreo de malezas es una pieza fundamental para la toma de decisiones.** Es importante destacar que Mayoral® puede ser utilizado como herbicida: PREEMERGENTE o POSTEMERGENTE TEMPRANO de malezas (estas absorben el herbicida por hoja y raíces).

Mayoral® es un herbicida que tiene acción sistémica y residual una vez incorporado al suelo, lo cual permite controlar malezas presentes hasta ese momento, como así también las que germinen posteriormente hasta el cierre del entresurco.

Siembra

Estado





Presencia de latifoliadas normalmente controladas por Atrazina + Mayoral® y las siguientes gramíneas:

- Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*)
- Pasto colorado (*Echinochloa colonum*)
- Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)
- Pasto bandera (*Urochloa platyphylla*)
- Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*)



APLICAR EN PREEMERGENCIA O POST EMERGENCIA TEMPRANA:

2 lts/ha de Atrazina al 50% + 230 cc/ha de Mayoral® (en caso de presencia de malezas emergidas el día de la siembra, se recomienda resetear el lote con mezcla de herbicidas recomendados por su asesor en base a las especies presentes y eventuales resistencias a herbicidas).

En caso de presencia de Eleusine (*Eleusine indica*) y Capín arroz (*Echinochloa crus - galli*) resistente a imidazolinonas, se recomienda el uso de 1 lt/ha de S-metolaclo-ro en preemergencia teniendo la precaución de utilizar semilla tratada con Concep® III. En suelos con alto contenido de arena y menos del 1% de MO no se recomienda el uso de Atrazina en sorgo. Advanta sólo recomienda el uso de Atrazina en sorgo en países donde su uso se encuentra permitido.

Propuesta de uso en sorgos forrajeros para pastoreo ...

Se recomienda la aplicación de imidazolinonas en sorgo forrajero únicamente en preemergencia.

Con el fin de preservar la tecnología y demorar la proliferación de malezas resistentes, se recomienda la combinación de atrazina en conjunto con imidazolinonas a fin de utilizar más de un modo de acción.

Presencia de latifoliadas normalmente controladas por Atrazina + Mayoral® y las siguientes gramíneas:

- Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*)
- Pasto colorado (*Echinochloa colonum*)
- Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)
- Pasto bandera (*Urochloa platyphylla*)
- Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*)



APLICAR EN PRE EMERGENCIA:

2 lts/ha de Atrazina al 50% + 230 cc/ha de Mayoral® (en caso de presencia de malezas emergidas el día de la siembra, se recomienda resetear el lote con mezclade herbicidas recomendados por su asesor en base a las especies presentes y eventuales resistencias a herbicidas).

Referencias



Momento de pastoreo recomendado en base a categoría y capacidad de consumo animal



Momento de aplicación recomendado

Decisión de aplicación según situación de malezas

FASE VEGETATIVA



Siembra

Altura (cm)

Días

-8

-3

0

0

10

9

20

24

55

40

105

50

En caso de presencia de Eleusine (*Eleusine indica*) y Capín arroz (*Echinochloa crus - galli*) resistente a imidazolinonas, se recomienda el uso de 1 lt/ha de S-metolaclo en preemergencia teniendo la precaución de utilizar semilla tratada con Concep® III. En suelos con alto contenido de arena y menos del 1% de MO no se recomienda el uso de Atrazina de sorgo. Advanta sólo recomienda el uso de Atrazina en sorgo en países donde su uso se encuentra permitido.

Características y beneficios del uso de Mayoral® en sorgos igrowth® ...

 Inicio



Composición (equivalente ácido):
Imazapic 26,2% p/v + Imazapir 8,7% p/v




Disminuye drásticamente el nacimiento de conyza y contribuye en latifoliadas no resistentes a ALS.



Excelente control de Digitaria, Eleusine y SARG.



Compatible con hormonales, Secafol (paraquat), Atranex, Polaris (glifosato).



Permite destinar el lote a maíz IMI.

Restricciones de uso

- Entre la aplicación y la siembra del cultivo subsiguiente no tolerante a imidazolinonas deben acumularse al menos 300mm o bien transcurrir 120 días. Hasta tanto no se disponga de más información solo se recomienda la siembra de los cultivos después del cultivo tratado con Mayoral®: soja, arveja, lenteja, poroto, maní, alfalfa, tréboles, avena, cebada, centeno, trigo, maíz, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo, pasto ovido, cebadilla criolla, festuca, rye grass anual y rye grass perenne.
- Requiere de 20mm (no sumatoria) como precipitación mínima necesaria para la incorporación.
- No mezclar insecticidas organofosforados con Mayoral®.

Si usted tiene alguna consulta después de revisar esta información, por favor contáctese con su distribuidor local o agrónomo de Advanta.



 Inicio

VT TriplePRO[®]

 **Agrisure Viptera 3**

Trecepta[®]



MAÍZ

ADV 8620 VT3P/GR

ADV 8122 VT3PRO

ADV 8413 VIP3

ADV 8066 TRE

ADV 8620 VT3P/GR



Excelente performance en siembras tempranas y tardías, destacándose tanto para cosecha de grano o silaje en ambientes de medio a bajo potencial.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

CICLO	COMPLETO
MADUREZ RELATIVA	124
DÍAS A FLORACIÓN (1)	72
GDU (SIEMBRA-FLORACIÓN) (2) (**)	884

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS

ALTURA DE PLANTA (CM) (2)	237
ALTURA DE INSERCIÓN DE ESPIGA (2)	98
TIPO DE GRANO	SEMIDENTADO


COMPORTAMIENTO SANITARIO

MAL DE RÍO CUARTO	I	● TB	● TM	● TA	
ROYA DEL MAÍZ	I	● TB	● TM	● TA	
TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO	I	● TB	● TM	● TA	
TIZÓN	I	● TB	● TM	● TA	
COMPLEJO DE ACHAPARRAMIENTO	I	● TB	● TM	● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (MILES DE PLANTAS/HA) (#):	
AMBIENTE POTENCIAL ALTO (>10 TN/HA)	65 - 85
AMBIENTE POTENCIAL MEDIO (6-10 TN/HA)	55 - 65
AMBIENTE POTENCIAL BAJO (<6 TN/HA)	50 - 55


REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 8413 VIP3



Combina la mejor protección contra Spodoptera Frugiperda y la máxima estabilidad de rendimiento en todos los ambientes maiceros.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

CICLO	INTERMEDIO
MADUREZ RELATIVA	122
DÍAS A FLORACIÓN (1)	71
GDU (SIEMBRA-FLORACIÓN) (2) (**)	845

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS

ALTURA DE PLANTA (CM) (2)	220
ALTURA DE INSERCIÓN DE ESPIGA (2)	91
TIPO DE GRANO	SEMIDENTADO


COMPORTAMIENTO SANITARIO

MAL DE RÍO CUARTO	I	● TB	● TM	● TA	
ROYA DEL MAÍZ	I	● TB	● TM	● TA	
TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO	I	● TB	● TM	● TA	
TIZÓN	I	● TB	● TM	● TA	
COMPLEJO DE ACHAPARRAMIENTO	I	● TB	● TM	● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (MILES DE PLANTAS/HA) (#):	
AMBIENTE POTENCIAL ALTO (>10 TN/HA)	75 - 85
AMBIENTE POTENCIAL MEDIO (6-10 TN/HA)	50 - 65
AMBIENTE POTENCIAL BAJO (<6 TN/HA)	45 - 50


REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 8122 VT3P/GR



Híbrido de ciclo intermedio con alto potencial de rendimiento y excelente perfil sanitario.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

CICLO	INTERMEDIO
MADUREZ RELATIVA	122
DÍAS A FLORACIÓN (1)	70
GDU (SIEMBRA-FLORACIÓN) (2) (**)	845

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS

ALTURA DE PLANTA (CM) (2)	226
ALTURA DE INSERCIÓN DE ESPIGA (2)	106
TIPO DE GRANO	SEMIDENTADO


COMPORTAMIENTO SANITARIO

MAL DE RÍO CUARTO	● TB ● TM ● TA	
ROYA DEL MAÍZ	● TB ● TM ● TA	
TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO	● TB ● TM ● TA	
TIZÓN	● TB ● TM ● TA	
COMPLEJO DE ACHAPARRAMIENTO	● TB ● TM ● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (MILES DE PLANTAS/HA) (#):	
AMBIENTE POTENCIAL ALTO (>10 TN/HA)	75 - 85
AMBIENTE POTENCIAL MEDIO (6-10 TN/HA)	65
AMBIENTE POTENCIAL BAJO (<6 TN/HA)	50 - 55


REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 8066 TRE



Explora el más alto potencial de rendimiento incluso en zonas con alta presión de lepidópteros, gracias a la tecnología Trecepta.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

CICLO	INTERMEDIO
MADUREZ RELATIVA	121
DÍAS A FLORACIÓN (1)	69
GDU (SIEMBRA-FLORACIÓN) (2) (**)	815

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS

ALTURA DE PLANTA (CM) (2)	225
ALTURA DE INSERCIÓN DE ESPIGA (2)	103
TIPO DE GRANO	SEMIDENTADO


COMPORTAMIENTO SANITARIO


MAL DE RÍO CUARTO	I	● TB	● TM	● TA	
ROYA DEL MAÍZ	I	● TB	● TM	● TA	
TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO	I	● TB	● TM	● TA	
TIZÓN	I	● TB	● TM	● TA	
COMPLEJO DE ACHAPARRAMIENTO	I	● TB	● TM	● TA	

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (MILES DE PLANTAS/HA) (#):	
AMBIENTE POTENCIAL ALTO (>10 TN/HA)	75 - 85
AMBIENTE POTENCIAL MEDIO (6-10 TN/HA)	60 - 70
AMBIENTE POTENCIAL BAJO (<6 TN/HA)	50 - 60

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN






REFERENCIAS

MAÍZ

R - Resistente / S - Susceptible / NA - No Aplica
TA tolerancia alta / TM tolerancia media / TB tolerancia baja

VT Triple PRO, Trecepta® y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer
Agrisure Viptera 3 es una marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.2017/18 a 2021/22.

- (1)** Dato promedio para Venado Tuerto, siembras de octubre, campañas 2019/20 a 2021/22)
- (2)** Datos promedio en Venado Tuerto con 85.000 pl/ha en siembras de septiembre y octubre. Campañas 2019/20 a 2021/22.
- (++)** El tiempo térmico en GDU se calcula de la siguiente manera: $TT (GDU) = \text{Temperatura media diaria} - \text{Temperatura base } (10^{\circ}\text{C})$
- (#)** La densidad óptima a cosecha varía de acuerdo a la zona, fecha de siembra, tecnología aplicada y manejo agronómico. (Cuanto mayor es el potencial ambiente, la densidad óptima se acerca al límite superior del rango indicado).



 Inicio



Clearfield® Plus
Sistema de Producción



Clearfield®
Sistema de Producción



GIRASOL

AGUARA 6

ADV 5505 CL

ADV 5420 CLPLUS

ADV 5407 CL

ADV 5310 CL

ADV 5205 CLHO

AGUARA 6

CONVENCIONAL



Máxima rusticidad y adaptación al NEA

DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	ESTRIADO
CICLO	INTERMEDIO-LARGO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	89
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	NA
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	NA
ALTURA (CM)	185
MATERIA GRASA	ALTA


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	I	TB	TM	TA	
SCLEROTINIA	I	TB	TM	TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	I	TB	TM	TA	S
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	I	TB	TM	TA	NA
PHOMOPSIS DE TALLO	I	TB	TM	TA	NA
ROYA NEGRA					R
VUELCO Y QUEBRADO					
ROYA BLANCA					

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	50.000 - 55.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	45.000 - 50.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	40.000 - 45.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 5420 CLPLUS



Destacada performance en la región norte, con un excepcional contenido de materia grasa y muy buen fenotipo de planta, caracterizado por su capítulo decumbente.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	NEGRO
CICLO	INTERMEDIO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	89
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	75
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	71
ALTURA (CM)	175
MATERIA GRASA	MUY ALTA


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	● TB ● TM ● TA	
SCLEROTINIA	● TB ● TM ● TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	● TB ● TM ● TA	R
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	● TB ● TM ● TA	
PHOMOPSIS DE TALLO	● TB ● TM ● TA	
ROYA NEGRA		
VUELCO Y QUEBRADO		
ROYA BLANCA		

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	50.000 - 60.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	40.000 - 53.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	30.000 - 35.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 5310 CL



Híbrido de ciclo intermedio que combina la mejor tolerancia a Phomopsis y el más alto potencial de rendimiento ajustado por aceite.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	NEGRO
CICLO	INTERMEDIO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	85
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	74
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	70
ALTURA (CM)	170
MATERIA GRASA	MUY ALTA


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	● TB ● TM ● TA	
SCLEROTINIA	● TB ● TM ● TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	● TB ● TM ● TA	R
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	● TB ● TM ● TA	
PHOMOPSIS DE TALLO	● TB ● TM ● TA	
ROYA NEGRA		NA
VUELCO Y QUEBRADO		
ROYA BLANCA		

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	55.000 - 65.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	43.000 - 53.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	35.000 - 40.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 5505 CL



Adaptado a todas las regiones girasoleras, destacandose por su estabilidad de rendimiento en todo tipo de ambientes.

DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	NEGRO
CICLO	LARGO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	91
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	77
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	73
ALTURA (CM)	190
MATERIA GRASA	MUY ALTA


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	● TB ● TM ● TA	
SCLEROTINIA	● TB ● TM ● TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	● TB ● TM ● TA	R
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	● TB ● TM ● TA	
PHOMOPSIS DE TALLO	● TB ● TM ● TA	
ROYA NEGRA		R
VUELCO Y QUEBRADO		
ROYA BLANCA		

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	55.000 - 65.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	43.000 - 53.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	33.000 - 38.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 5407 CL



Explora los máximos rendimientos en ambientes de medio a alto potencial, con un excepcional contenido de materia grasa.

DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	NEGRO
CICLO	INTERMEDIO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	87
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	75
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	71
ALTURA (CM)	170
MATERIA GRASA	MUY ALTA


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	● TB ● TM ● TA	
SCLEROTINIA	● TB ● TM ● TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	● TB ● TM ● TA	R
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	● TB ● TM ● TA	
PHOMOPSIS DE TALLO	● TB ● TM ● TA	
ROYA NEGRA		
VUELCO Y QUEBRADO		
ROYA BLANCA		

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	55.000 - 60.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	43.000 - 53.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	30.000 - 35.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

ADV 5205 CLHO



Alto potencial de rendimiento en grano con muy buena adaptación a las regiones girasoleras del centro y sur del país.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

COLOR DE GRANO	NEGRO
CICLO	INTERMEDIO
DÍAS EMERGENCIA/FLORACIÓN:	
NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)	NA
CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)	72
SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)	69
ALTURA (CM)	175
MATERIA GRASA	ALTA (>80% OLEICO)


COMPORTAMIENTO SANITARIO

VERTICILLIUM	I ● TB ● TM ● TA	R (**)
SCLEROTINIA	I ● TB ● TM ● TA	
DOWNY MILDEW RAZAS 300, 330, 710, 730 Y 770	I ● TB ● TM ● TA	R
PHOMOPSIS DE CAPÍTULO	I ● TB ● TM ● TA	
PHOMOPSIS DE TALLO	I ● TB ● TM ● TA	
ROYA NEGRA		
VUELCO Y QUEBRADO		
ROYA BLANCA		

MANEJO

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):	
AMBIENTES POTENCIAL ALTO (>3 TN/HA)	52.000 - 65.000
AMBIENTES POTENCIAL MEDIO (2-3 TN/HA)	40.000 - 50.000
AMBIENTES POTENCIAL BAJO (<2 TN/HA)	25.000 - 35.000

REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN



REFERENCIAS

Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país
R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica



Sorgo



Maíz




Girasol



Colza



Inicio



Clearfield®
Sistema de Producción

 Inicio



COLZA

HYOLA 117

HYOLA CONTINUUM CL

HYOLA EQUINOX CL

HYOLA SOLSTICE CL

HYOLA 117

CONVENCIONAL

Híbrido de ciclo corto con excelente adaptabilidad, que amplía la ventana de siembra y posibilita una liberación temprana del lote.



DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

CRUZAMIENTO	HÍBRIDO
TIPO	PRIMAVERAL
CICLO	CORTO
TOLERANCIA A HERBICIDAS	CONVENCIONAL
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS1: 27/5)	79
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS2: 12/6)	74
CONTENIDO DE ACEITE	ALTO
ALTURA DE PLANTA (CM)*	90 - 110

COMPORTAMIENTO SANITARIO

CANCRO DE TALLO (PHOMA)	● TB ● TM ● TA	
VUELCO	● TB ● TM ● TA	

MANEJO AGRONÓMICO

DENSIDAD A COSECHA (PL/M2)	60 a 80
----------------------------	---------

FECHAS DE SIEMBRA				ABRIL						MAYO						JUNIO					
	ÓPTIMA		SUB ÓPTIMA	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

REFERENCIAS

R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica

** | Fecha de siembra zona nucleo
* Altura de planta promedio zona núcleo campañas 23/24.
(1) Promedio ensayos Argentina Campañas 23/24 - Siembra 27/5.



Sorgo



Maíz



Girasol



Colza



Inicio

HYOLA CONTINUUM CL



Híbrido primaveral de ciclo intermedio corto que combina el mayor potencial de rendimiento del porfolio con excelente estabilidad.



DESCRIPCIÓN DEL
HÍBRIDO

CRUZAMIENTO	HÍBRIDO
TIPO	PRIMAVERAL
CICLO	INTERMEDIO CORTO
TOLERANCIA A HERBICIDAS	CLEARFIELD [®]
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS1: 27/5)	85
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS2: 12/6)	77
CONTENIDO DE ACEITE	MUY ALTO
ALTURA DE PLANTA (CM)*	110 - 130

COMPORTAMIENTO
SANITARIO

CANCRO DE TALLO (PHOMA)	● TB ● TM ● TA	
VUELCO	● TB ● TM ● TA	

MANEJO
AGRONÓMICO

DENSIDAD A COSECHA (PL/M2)	60 a 80
----------------------------	---------

FECHAS DE SIEMBRA				ABRIL						MAYO						JUNIO					
	ÓPTIMA		SUB ÓPTIMA	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

REFERENCIAS

R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica

** | Fecha de siembra zona nucleo
* Altura de planta promedio zona núcleo campañas 23/24.
(1) Promedio ensayos Argentina Campañas 23/24 - Siembra 27/5

HYOLA EQUINOX CL



Híbrido primaveral de ciclo intermedio corto, con amplia adaptabilidad y tecnología para el control de malezas.



DESCRIPCIÓN DEL
HÍBRIDO

CRUZAMIENTO	HÍBRIDO
TIPO	PRIMAVERAL
CICLO	INTERMEDIO CORTO
TOLERANCIA A HERBICIDAS	CLEARFIELD [®]
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS1: 27/5)	86
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS2: 12/6)	78
CONTENIDO DE ACEITE	ALTO
ALTURA DE PLANTA (CM)*	110 - 130

COMPORTAMIENTO
SANITARIO

CANCRO DE TALLO (PHOMA)	● TB ● TM ● TA	
VUELCO	● TB ● TM ● TA	

MANEJO
AGRONÓMICO

DENSIDAD A COSECHA (PL/M2)	60 a 80
----------------------------	---------

FECHAS DE SIEMBRA				ABRIL						MAYO						JUNIO					
	ÓPTIMA		SUB ÓPTIMA	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

REFERENCIAS

R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica

** | Fecha de siembra zona nucleo
* Altura de planta promedio zona núcleo campañas 23/24.
(1) Promedio ensayos Argentina Campañas 23/24 - Siembra 27/5

HYOLA SOLSTICE CL



Híbrido primaveral de ciclo intermedio corto, con muy alto potencial de rendimiento y tecnología Clearfield® para el control de malezas.



DESCRIPCIÓN DEL
HÍBRIDO

CRUZAMIENTO	HÍBRIDO
TIPO	PRIMAVERAL
CICLO	INTERMEDIO CORTO
TOLERANCIA A HERBICIDAS	CLEARFIELD®
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS1: 27/5)	85
DÍAS EMERGENCIA - FLORACIÓN (FS2: 12/6)	77
CONTENIDO DE ACEITE	MUY ALTO
ALTURA DE PLANTA (CM)*	110 - 130

COMPORTAMIENTO
SANITARIO

CANCRO DE TALLO (PHOMA)	● TB ● TM ● TA	
VUELCO	● TB ● TM ● TA	

MANEJO
AGRONÓMICO

DENSIDAD A COSECHA (PL/M2)	60 a 80
----------------------------	---------

FECHAS DE SIEMBRA				ABRIL						MAYO						JUNIO					
	ÓPTIMA		SUB ÓPTIMA	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

REFERENCIAS

R - Resistente / TA - Tolerancia alta / TM - Tolerancia media / TB - Tolerancia baja / S - Suceptible / NA - No aplica

** | Fecha de siembra zona nucleo
* Altura de planta promedio zona núcleo campañas 23/24.
(1) Promedio ensayos Argentina Campañas 23/24 - Siembra 27/5



ADVANTA

CULTIVAMOS LA *PASIÓN*
QUE NOS UNE